

AVERTISSEMENTS 2-09-06004436 **AGRICOLES**

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue 518, rue St Fuscien 80092 AMIENS CEDEX 3 Tél: 03.22.33.55.97 Fax: 03.22.33.55.56 E-mail: srpv.drafpicardie@agriculture.gouv.fr Notre site: www.srpvpicardie.com

participation de la FREDON Picardie par délégation (art. L252-1 à L252-5 du Code Rural).

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS Directeur gérant : Christophe MARTINET Publication périodique C.P.P.A.P n°1823AD ISSN n°07576609

Tarif Courrier 65 € Tarif Fax 61 € Tarif E-mail 58 €

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°18 du 11 septembre 2006 - 1 page

Mildiou

jusqu'à la récolte.

Situation sanitaire

Les conditions climatiques ont été très favorables au mildiou. Les symptômes sont réapparus en parcelle à partir du milieu du mois d'août. On observe également des symptômes sur tubercules depuis début septembre. La situation de cette fin de campagne est délicate. La vigilance doit être sans faille

Prévisions

Une génération supplémentaire a été enregistrée tout au long de la semaine passée. Les sorties de taches vont s'échelonner à partir de ce début de semaine. Les potentiels de sporulation sont très élevés sur la totalité des postes climatiques.

Même si les prévisions météorologiques s'annoncent encore sèches pour le début de semaine, les rosées matinales importantes maintiennent le risque à un niveau élevé.

Préconisations


Tous secteurs confondus:

Quelle que soit la variété et le secteur, les parcelles doivent être protégées en fin de persistance d'action du fongicide.

Rappelons qu'il est nécessaire de maintenir la protection fongicide jusqu'à la destruction complète de la végétation. Elle doit être soignée avant et après le défanage pour pouvoir obtenir des tubercules sains. L'utilisation de produits à action anti-sporulante est recommandée.

Le broyage des fanes est en général à proscrire en cas de mildiou déclaré en parcelle. Il risque en effet de disséminer la maladie à toute la récolte. Dans ce cas, le défanage reste la meilleure des solutions. Pour les producteurs de fécules, il est néanmoins possible de broyer à conditions qu'il soit réalisé juste avant la récolte.

Ces préconisations sont valables tant que les conditions actuelles persistent.



MILDIOU: Risque élevé. Maintenir la protection

P157